Bahamas



Country report card - adults

This report card contains the latest data available on the Global Obesity Observatory on overweight and obesity for adults. Where available, data on common and relevant obesity drivers and comorbidities are also presented.

View the latest version of this report on the Global Obesity Observatory at https://data.worldobesity.org/country/bahamas-14/.

Prevalencia de obesidad

Adultos, 2019



Tipo de encuesta:	Medido
Edad:	18-69
TamaÃ±o de la muestra:	3840
Zona abarcada:	Nacional
Referencias:	The Bahamas STEPS Survey 2019 FACT SHEET. Available at https://extranet.who.int/ncdsmicrodata/index.php/catalog/952/download/6803 (last accessed 05.02.25)

A menos que se indique lo contrario, el sobrepeso se refiere a un IMC entre 25Â kg y 29,9Â kg/mÂ² y la obesidad se refiere a un IMC superior a 30 kg/mÂ²..

% Adults living with obesity in Bahamas 1998-2019

Hombres



Tipo de encuesta:	Medido

Referencias: 1988: National Health and Nutrition Survey ftp://ftp.fao.org/es/esn/nutrition/ncp/bah.pdf (last accessed 14th April 2010)
2001: N Brathwaite, A Brathwaite, M Taylor. The Socio-economic Determinants of Obesity in Adults in the Bahamas.West Indian Med J 2011; 60 (4): 434
2011: Bahamas STEPS Survey 2012 Fact Sheet available at https://www.bahamas.gov.bs/wps/wcm/connect/9cfc74bb-a548-4660-b5b9-f570b47fec71/FactSheet_-2013+BAH+-+060314+Update+Final.pdf?MOD=AJPERES
2019: The Bahamas STEPS Survey 2019 FACT SHEET. Available at https://extranet.who.int/ncdsmicrodata/index.php/catalog/952/download/6803 (last accessed 05.02.25)

A menos que se indique lo contrario, el sobrepeso se refiere a un IMC entre 25Â kg y 29,9Â kg/mÂ² y la obesidad se refiere a un IMC superior a 30 kg/mÂ²..

Es posible que se hayan utilizado diferentes metodologÃas para recopilar estos datos y, por lo tanto, los resultados de las diferentes encuestas no siempre son estrictamente comparables. Consulte las fuentes de datos originales para informarse sobre las metodologÃas utilizadas.

Mujeres



Tipo de encuesta:	Medido
Referencias:	1988: National Health and Nutrition Survey ftp://ftp.fao.org/es/esn/nutrition/ncp/bah.pdf (last accessed 14th April 2010) 2001: N Brathwaite, A Brathwaite, M Taylor. The Socio-economic Determinants of Obesity in Adults in the Bahamas.West Indian Med J 2011; 60 (4): 434 2011: Bahamas STEPS Survey 2012 Fact Sheet available at https://www.bahamas.gov.bs/wps/wcm/connect/9cfc74bb-a548-4660-b5b9-f570b47fec71/FactSheet_-2013+BAH+-+060314+Update+Final.pdf?MOD=AJPERES 2019: The Bahamas STEPS Survey 2019 FACT SHEET. Available at https://extranet.who.int/ncdsmicrodata/index.php/catalog/952/download/6803 (last accessed 05.02.25)

A menos que se indique lo contrario, el sobrepeso se refiere a un IMC entre 25Â kg y 29,9Â kg/mÂ² y la obesidad se refiere a un IMC superior a 30 kg/mÂ²..

Es posible que se hayan utilizado diferentes metodologÃas para recopilar estos datos y, por lo tanto, los resultados de las diferentes encuestas no siempre son estrictamente comparables. Consulte las fuentes de datos originales para informarse sobre las metodologÃas utilizadas.

% Adults living with obesity in selected countries in the Americas Region 1960-2018, paÃses seleccionados

Hombres



Referencias:

1960, 1971, 1973, 1976, 1991: Flegal KM, Carroll MD, Kuczmarski RJ, Johnson CL. Overweight and obesity in the United States: prevalence and trends, 1960-1994. International Journal of Obesity (1998);22:39-47
1975: Monteiro CA, Conde WL, Popking BM. Is obesity replacing or adding to undernutrition? Evidence from different social classes in Brazil. 2002. Public Health Nutrition:51(1A), 105-112
1988: Berrios X, Jadue I, Zenteno J, Ross MI, Rodriguez H. Prevalencia de factores de riesgo para enfermedades cronicas. Estudio de la poblacion general de la region Metropolitana, 1986-1987. Rev. Med. Chile. 1990;118:597-604
1992: Uauy R, Albal C, Kain J. Obesity Trends in Latin America: Transiting from Under-to Overweight. Journal of Nutrition 2001;131:S893-S899
1994, 1995: Martorell R, Khan LK, Hughes ML, Grummer Strawn LM. Obesity in women from developing countries. EJCN (2000) 54;247-252
1997: Filozof C, Gonzales C, Sereday M, Mazza C, Braguinsky J. Obesity prevalence and trends in Latin American countries. Obesity Reviews, 2001;2:99-196
1998: Instituto Nacional de Estadística - INE/Guatemala and Macro International. 1999. Guatemala Encuesta Nacional de Salud Materno Infantil 1998-1999. Calverton, Maryland, USA: Instituto Nacional de Estadística - INE/Guatemala and Macro International.
1999: Centres for Disease Control and Prevention. http://www.cdc.gov/
2000: Personal Communication from Dr C Sanchez Castillio, Body Mass Index cutoff points for Type 2 Diabetes Melliuts and Hypertension in the Mexican National Health Survey 2000.
2001: Ogden CL, Carroll MD, Curtin LR, McDowell MA, Tabak CJ, Flegal KM. Prevalence of Overweight and Obesity in the United States, 1999-2004. JAMA 2006;295(13):1549-1555
2002: Monteiro CA, Conde WL and Popkin BA. (2007). Income-specific trends in obesity in Brazil: 1975 - 2003. American Journal of Public Health, 97 (10): 1808 - 1812.
2003: 2003 ENS Report. Final results on the National Health Survey. Http://epi.minsal.cl/epi/html/invest/ENS/informeFinalENS.pdf.
2004: Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Encuesta Nacional de la Situación Nutricional (ENSIN), 2005. (2006). Available at: https://www.icbf.gov.co/sites/default/files/libro_2005.pdf [Accessed 18.07.25]
2005: Cayemittes, Michel, Marie Florence Placide, Soumaïla Mariko, Bernard Barrère, Blaise Sévère, and Canez Alexandre. 2007. Enquête Mortalité, Morbidité et Utilisation des Services, Haïti, 2005-2006. Calverton, Maryland, USA: Ministère de la Santé Publique et de la Population, Institut Haïtien de l'Enfance and Macro International.
2006: Olaiz-Fernández G, Rivera-Dommarco J, Shamah-Levy T, Rojas R, Villalpando-Hernández S, Hernández-Avila M, Sepúlveda-Amor J. Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2006. Cuernavaca, México: Instituto Nacional de Salud Pública, 2006. (National Health and Nutrition Survey 2006).
2007: Flegal KM, Carroll MD, Ogden CL and Curtin LR. (2010). Prevalence and trends in obesity among US adults, 1999-2008. Journal of the American Medical Association, 303 (3): 235 - 241.
2008: Ramirez-Zea M, Kroker-Lobos MF, Close-Fernandez R, Kanter R. The double burden of malnutrition in indigenous and nonindigenous Guatemalan populations. Am J Clin Nutr. 2014 Dec;100(6):1644S-51S. doi: 10.3945/ajcn.114.083857
2009: NHANES Survey - Published in Flegal KM, Carrolll MD, Kit BK, Ogden CL. Prevalence of Obesity and Trends in the Distribution of Body Mass Index Among US Adults, 1999-2010. JAMA Published online January 17, 2012. doi: 10.1001/jama.2012.39
2010: ENSIN 2010. Available at https://www.minsalud.gov.co/ (last accessed 05.10.20)
2011: Ruopeng An, "Prevalence and Trends of Adult Obesity in the US, 1999–2012", ISRN Obesity, vol. 2014, Article ID 185132, 6 pages, 2014. doi:10.1155/2014/185132
2012: Cayemittes, Michel, Michelle Fatuma Busangu, Jean de Dieu Bizimana, Bernard Barrère, Blaise Sévère, Viviane Cayemittes and Emmanuel Charles. 2013. Enquête Mortalité, Morbidité et Utilisation des Services, Haïti, 2012. Calverton, Maryland, USA: Ministère de la Santé Publique et de la Population - MSPP/Haïti , l'Institut Haïtien de l'Enfance - IHE, and ICF International.
2013: FERREIRA, Arthur Pate de Souza; SZWARCWALD, Célia Landmann and DAMACENA, Giseli Nogueira. Prevalence of obesity and associated factors in the Brazilian population: a study of data from the 2013 National Health Survey. Rev. bras. epidemiol. [online]. 2019, vol.22 [cited 2019-05-16], e190024. Available from: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-790X2019000100420&lng=en&nrm=iso. Epub Apr 01, 2019. ISSN 1415-790X. http://dx.doi.org/10.1590/1980-549720190024.
2014: Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social - MSPAS/Guatemala, Instituto Nacional de Estadística - INE/Guatemala, Secretaría de Planificación y Programación del la Presidencia - Segeplán/Guatemala and ICF International. 2017. Encuesta Nacional de Salud Materno Infantil 2014-2015: Informe Final. Rockville, Maryland, USA: MSPAS, INE, Segeplán and ICF International.
2015: ENSIN 2015. Available at https://www.minsalud.gov.co/ (last accessed 05.10.20)
2016: Encuesta Nacional de Salud y Nutrición de Medio Camino 2016
2017: Reanalysis of NHANES 2017/18 by Rachel Jackson Leach, Jaynaide Powis World Obesity Federation
2018: 4th National Survey, Full report available at http://www.msal.gob.ar/images/stories/bes/graficos/0000001622cnt-2019-10_4ta-encuesta-nacional-factores-riesgo.pdf (last accessed 29.04.20)
2019: Pesquisa nacional de saúde : 2019 : ciclos de vida : Brasil / IBGE, Coordenação de Trabalho e Rendimento. - Rio de Janeiro : IBGE, 2021. Available at https://www.ibge.gov.br/en/statistics/social/health/16840-national-survey-of-health.html?=&t=resultados (last accessed 04.04.23)
2020: INEI (2021) Peru Encuesta Demografica y de Salud Familiar Endes 2020. Available at https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib1795/ (last accessed 28.03.23)
2021: Shamah-Levy T, Romero-Martínez M, Barrientos-Gutiérrez T, Cuevas-Nasu L, Bautista-Arredondo S, Colchero MA, Gaona-Pineda EB, Lazcano-Ponce E,Martínez-Barnetche J, Alpuche-Arana C, Rivera-Dommarco J. Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2021 sobre Covid-19. Resultados nacionales. Cuernavaca, México: Instituto Nacional de Salud Pública, 2022. https://ensanut.insp.mx/encuestas/ensanutcontinua2021/informes.php (Accessed 03.01.2023)
2022: Perú: Encuesta Demográfica y de Salud Familiar 2022 - Nacional y Departamental. Available at https://www.gob.pe/institucion/inei/informes-publicaciones/4233597-peru-encuesta-demografica-y-de-salud-familiar-endes-2022
2023: Shamah-Levy T, Lazcano-Ponce EC, Cuevas-Nasu L, Romero-Martínez M, Gaona-Pineda EB, Gómez-Acosta LM,

Es posible que se hayan utilizado diferentes metodologÃas para recopilar estos datos y, por lo tanto, los resultados de las diferentes encuestas no siempre son estrictamente comparables. Consulte las fuentes de datos originales para informarse sobre las metodologÃas utilizadas.

Mujeres



Referencias:

1960, 1971, 1973, 1976, 1991: Flegal KM, Carroll MD, Kuczmarski RJ, Johnson CL. Overweight and obesity in the United States: prevalence and trends, 1960-1994. International Journal of Obesity (1998);22:39-47

1975: Monteiro CA, Conde WL, Popking BM. Is obesity replacing or adding to undernutrition? Evidence from different social classes in Brazil. 2002. Public Health Nutrition:51(1A), 105-112

1988: Berrios X, Jadue I, Zenteno J, Ross MI, Rodriguez H. Prevalencia de factores de riesgo para enfermedades cronicas. Estudio de la poblacion general de la region Metropolitana, 1986-1987. Rev. Med. Chile. 1990;118:597-604

1992: Uauy R, Albal C, Kain J. Obesity Trends in Latin America: Transiting from Under-to Overweight. Journal of Nutrition 2001;131:S893-S899

1994, 1995: Martorell R, Khan LK, Hughes ML, Grummer Strawn LM. Obesity in women from developing countries. EJCN (2000) 54;247-252

1997: Filozof C, Gonzales C, Sereday M, Mazza C, Braguinsky J. Obesity prevalence and trends in Latin American countries. Obesity Reviews, 2001;2:99-196

1998: Instituto Nacional de Estadística - INE/Guatemala and Macro International. 1999. Guatemala Encuesta Nacional de Salud Materno Infantil 1998-1999. Calverton, Maryland, USA: Instituto Nacional de Estadística - INE/Guatemala and Macro International.

1999: Centres for Disease Control and Prevention. http://www.cdc.gov/

2000: Personal Communication from Dr C Sanchez Castillio, Body Mass Index cutoff points for Type 2 Diabetes Melliuts and Hypertension in the Mexican National Health Survey 2000.

2001: Ogden CL, Carroll MD, Curtin LR, McDowell MA, Tabak CJ, Flegal KM. Prevalence of Overweight and Obesity in the United States, 1999-2004. JAMA 2006;295(13):1549-1555

2002: Monteiro CA, Conde WL and Popkin BA. (2007). Income-specific trends in obesity in Brazil: 1975 - 2003. American Journal of Public Health, 97 (10): 1808 - 1812.

2003: 2003 ENS Report. Final results on the National Health Survey. Http://epi.minsal.cl/epi/html/invest/ENS/informeFinalENS.pdf.

2004: Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Encuesta Nacional de la Situación Nutricional (ENSIN), 2005. (2006). Available at: https://www.icbf.gov.co/sites/default/files/libro_2005.pdf [Accessed 18.07.25]

2005: Cayemittes, Michel, Marie Florence Placide, Soumaïla Mariko, Bernard Barrère, Blaise Sévère, and Canez Alexandre. 2007. Enquête Mortalité, Morbidité et Utilisation des Services, Haïti, 2005-2006. Calverton, Maryland, USA: Ministère de la Santé Publique et de la Population, Institut Haïtien de l'Enfance and Macro International.

2006: Olaiz-Fernández G, Rivera-Dommarco J, Shamah-Levy T, Rojas R, Villalpando-Hernández S, Hernández-Avila M, Sepúlveda-Amor J. Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2006. Cuernavaca, México: Instituto Nacional de Salud Pública, 2006. (National Health and Nutrition Survey 2006).

2007: Flegal KM, Carroll MD, Ogden CL and Curtin LR. (2010). Prevalence and trends in obesity among US adults, 1999-2008. Journal of the American Medical Association, 303 (3): 235 - 241.

2008: Ramirez-Zea M, Kroker-Lobos MF, Close-Fernandez R, Kanter R. The double burden of malnutrition in indigenous and nonindigenous Guatemalan populations. Am J Clin Nutr. 2014 Dec;100(6):1644S-51S. doi: 10.3945/ajcn.114.083857

2009: NHANES Survey - Published in Flegal KM, Carrolll MD, Kit BK, Ogden CL. Prevalence of Obesity and Trends in the Distribution of Body Mass Index Among US Adults, 1999-2010. JAMA Published online January 17, 2012. doi: 10.1001/jama.2012.39

2010: ENSIN 2010. Available at https://www.minsalud.gov.co/ (last accessed 05.10.20)

2011: Ruopeng An, "Prevalence and Trends of Adult Obesity in the US, 1999-2012", ISRN Obesity, vol. 2014, Article ID

Es posible que se hayan utilizado diferentes metodologÃas para recopilar estos datos y, por lo tanto, los resultados de las diferentes encuestas no siempre son estrictamente comparables. Consulte las fuentes de datos originales para informarse sobre las metodologÃas utilizadas.

Sobrepeso/obesidad segÃºn nivel de estudios

Hombres, 2001



Tipo de encuesta:	Medido
Edad:	21-60
TamaÃ±o de la muestra:	1238
Zona abarcada:	Nacional
Referencias:	N Brathwaite, A Brathwaite, M Taylor. The Socio-economic Determinants of Obesity in Adults in the Bahamas.West Indian Med J 2011; 60 (4): 434

A menos que se indique lo contrario, el sobrepeso se refiere a un IMC entre 25Â kg y 29,9Â kg/mÂ² y la obesidad se refiere a un IMC superior a 30 kg/mÂ²..

Mujeres, 2001



Tipo de encuesta:	Medido
Edad:	21-60
TamaÃ±o de la muestra:	1238
Zona abarcada:	Nacional

Referencias: N Brathwaite, A Brathwaite, M Taylor. The Socio-economic Determinants of Obesity in Adults in the Bahamas.West Indian Med J 2011; 60 (4): 434

A menos que se indique lo contrario, el sobrepeso se refiere a un IMC entre 25Â kg y 29,9Â kg/mÂ² y la obesidad se refiere a un IMC superior a 30 kg/mÂ²..

Sobrepeso/obesidad por regiÃ³n

Hombres, 2001



Tipo de encuesta:	Medido
Edad:	21-60
TamaÃ±o de la muestra:	1254
Zona abarcada:	Nacional
Referencias:	N Brathwaite, A Brathwaite, M Taylor. The Socio-economic Determinants of Obesity in Adults in the Bahamas.West Indian Med J 2011; 60 (4): 434

A menos que se indique lo contrario, el sobrepeso se refiere a un IMC entre 25Â kg y 29,9Â kg/mÂ² y la obesidad se refiere a un IMC superior a 30 kg/mÂ²..

Mujeres, 2001



Tipo de encuesta:	Medido
Edad:	21-60
TamaÃ±o de la muestra:	1254
Zona abarcada:	Nacional
Referencias:	N Brathwaite, A Brathwaite, M Taylor. The Socio-economic Determinants of Obesity in Adults in the Bahamas.West Indian Med J 2011; 60 (4): 434

A menos que se indique lo contrario, el sobrepeso se refiere a un IMC entre 25Â kg y 29,9Â kg/mÂ² y la obesidad se refiere a un IMC superior a 30 kg/mÂ²..

Sobrepeso/obesidad por nivel socioeconÃ³mico

Hombres, 2001



Tipo de encuesta:	Medido
Edad:	21-60
TamaÃ±o de la muestra:	1254
Zona abarcada:	Nacional
Referencias:	N Brathwaite, A Brathwaite, M Taylor. The Socio-economic Determinants of Obesity in Adults in the Bahamas.West Indian Med J 2011; 60 (4): 434

A menos que se indique lo contrario, el sobrepeso se refiere a un IMC entre 25Â kg y 29,9Â kg/mÂ² y la obesidad se refiere a un IMC superior a 30 kg/mÂ²..

Mujeres, 2001



Tipo de encuesta:	Medido
Edad:	21-60
TamaÃ±o de la muestra:	1254
Zona abarcada:	Nacional

Referencias: N Brathwaite, A Brathwaite, M Taylor. The Socio-economic Determinants of Obesity in Adults in the Bahamas.West Indian Med J 2011; 60 (4): 434

A menos que se indique lo contrario, el sobrepeso se refiere a un IMC entre 25Â kg y 29,9Â kg/mÂ² y la obesidad se refiere a un IMC superior a 30 kg/mÂ²..

Double burden of underweight & overweight

Adultos, 2022



Tipo de encuesta:	Medido
Edad:	20+
Referencias:	NCD Risk Factor Collaboration (NCD-RisC). Worldwide trends in underweight and obesity from 1990 to 2022: a pooled analysis of 3663 population representative studies with 222 million children, adolescents, and adults. Lancet 2024; published online Feb 29. https://doi.org/10.1016/S0140-6736(23)02750-2.

Notas:	Age Standardised estimates
Definiciones (solo disponible en inglÃ©s):	Combined prevalence of BMI<18.5 kg/m² and BMI>=30 kg/m² (double burden of underweight and obesity)

Actividad fÃsica insuficiente

Adultos, 2022



Tipo de encuesta:	Autodeclarado
Edad:	18+
Zona abarcada:	Nacional

Referencias:	WHO (2024). Prevalence of insufficient physical activity among adults aged 18-years age-standardized estimate in 2022. Available at https://www.who.int/data/gho/data/indicators/indicator-details/GHO/prevalence-of-insufficient-physical-activity-among-adults-aged-18-years-(age-standardized-estimate)-(-)
Definiciones (solo disponible en inglÃ©s):	Percent of population attaining less than 150 minutes of moderate-intensity physical activity per week, or less than 75 minutes of vigorous-intensity physical activity per week, or equivalent.

Hombres, 2022



Tipo de encuesta:	Autodeclarado
Edad:	18+
Zona abarcada:	Nacional
Referencias:	WHO (2024). Prevalence of insufficient physical activity among adults aged 18-years age-standardized estimate in 2022. Available at https://www.who.int/data/gho/data/indicators/indicator-details/GHO/prevalence-of-insufficient-physical-activity-among-adults-aged-18-years-(age-standardized-estimate)-(-)

Definiciones (solo disponible en inglÃ©s):	Percent of population attaining less than 150 minutes of moderate-intensity physical activity per week, or less than 75 minutes of vigorous-intensity physical activity per week, or equivalent.

Mujeres, 2022



Tipo de encuesta:	Autodeclarado
Edad:	18+
Zona abarcada:	Nacional
Referencias:	WHO (2024). Prevalence of insufficient physical activity among adults aged 18-years age-standardized estimate in 2022. Available at https://www.who.int/data/gho/data/indicators/indicator-details/GHO/prevalence-of-insufficient-physical-activity-among-adults-aged-18-years-(age-standardized-estimate)-(-)

Definiciones (solo disponible en inglÃ©s):	Percent of population attaining less than 150 minutes of moderate-intensity physical activity per week, or less than 75 minutes of vigorous-intensity physical activity per week, or equivalent.

Estimated per capita fruit intake

Adultos, 2017



Tipo de encuesta:	Medido
Edad:	25+
Referencias:	Global Burden of Disease, the Institute for Health Metrics and Evaluation http://ghdx.healthdata.org/
Definiciones (solo disponible en inglÃ©s):	Estimated per-capita fruit intake (g/day)

Ingesta estimada de carne procesada per cÃ¡pita

Adultos, 2017



Tipo de encuesta:	Medido
Edad:	25+
Referencias:	Global Burden of Disease, the Institute for Health Metrics and Evaluation http://ghdx.healthdata.org/
Definiciones (solo disponible en inglÃ©s):	Estimated per-capita processed meat intake (g per day)

Estimated per capita whole grains intake

Adultos, 2017



Tipo de encuesta:	Medido
Edad:	25+
Referencias:	Global Burden of Disease, the Institute for Health Metrics and Evaluation http://ghdx.healthdata.org/

Definiciones (solo disponible en inglÃ©s):	Estimated per-capita whole grains intake (g/day)

Salud mental: trastornos de depresiÃ³n

Adultos, 2021



Edad:	20+
Zona abarcada:	Nacional

Referencias:	Institute for Health Metrics and Evaluation (IHME). GBD Compare Data Visualization. Global Burden of Disease (GBD) Study 2021. Seattle, WA: IHME, University of Washington, 2023. Available from http://vizhub.healthdata.org/gbd-compare. (Last accessed 23.04.25)
Definiciones (solo disponible en inglÃ©s):	Number living with depression per 100,000 population (adults 20+ years)

Hombres, 2021



Edad:	20+
Zona abarcada:	Nacional
Referencias:	Institute for Health Metrics and Evaluation (IHME). GBD Compare Data Visualization. Global Burden of Disease (GBD) Study 2021. Seattle, WA: IHME, University of Washington, 2023. Available from http://vizhub.healthdata.org/gbd-compare. (Last accessed 23.04.25)

Definiciones (solo disponible en inglÃ©s):	Number living with depression per 100,000 population (adults 20+ years)

Mujeres, 2021



Edad:	20+
Zona abarcada:	Nacional
Referencias:	Institute for Health Metrics and Evaluation (IHME). GBD Compare Data Visualization. Global Burden of Disease (GBD) Study 2021. Seattle, WA: IHME, University of Washington, 2023. Available from http://vizhub.healthdata.org/gbd-compare. (Last accessed 23.04.25)

Definiciones (solo disponible en inglÃ©s):	Number living with depression per 100,000 population (adults 20+ years)

Salud mental: trastornos de ansiedad

Adultos, 2021



Edad:	20+
Referencias:	Institute for Health Metrics and Evaluation (IHME). GBD Compare Data Visualization. Global Burden of Disease (GBD) Study 2021. Seattle, WA: IHME, University of Washington, 2023. Available from http://vizhub.healthdata.org/gbd-compare. (Last accessed 23.04.25).

Definiciones (solo disponible en inglÃ©s):	Number living with anxiety per 100,000 population

Hombres, 2021



Edad:	20+
Referencias:	Institute for Health Metrics and Evaluation (IHME). GBD Compare Data Visualization. Global Burden of Disease (GBD) Study 2021. Seattle, WA: IHME, University of Washington, 2023. Available from http://vizhub.healthdata.org/gbd-compare. (Last accessed 23.04.25).
Definiciones (solo disponible en inglÃ©s):	Number living with anxiety per 100,000 population

Mujeres, 2021



Edad:	20+
Referencias:	Institute for Health Metrics and Evaluation (IHME). GBD Compare Data Visualization. Global Burden of Disease (GBD) Study 2021. Seattle, WA: IHME, University of Washington, 2023. Available from http://vizhub.healthdata.org/gbd-compare. (Last accessed 23.04.25).
Definiciones (solo disponible en inglÃ©s):	Number living with anxiety per 100,000 population

CÃ¡ncer de esÃ³fago

Hombres, 2022



Edad:	20+
Zona abarcada:	Nacional

Referencias:	Ferlay J, Ervik M, Lam F, Laversanne M, Colombet M, Mery L, Piñeros M, Znaor A, Soerjomataram I, Bray F (2024).Global Cancer Observatory: Cancer Today. Lyon, France: International Agency for Research on Cancer. Available from: https://gco.iarc.who.int/today, accessed [16.07.24]
Definiciones (solo disponible en inglÃ©s):	Indicence per 100,000

Mujeres, 2022



Edad:	20+
Zona abarcada:	Nacional
Referencias:	Ferlay J, Ervik M, Lam F, Laversanne M, Colombet M, Mery L, Piñeros M, Znaor A, Soerjomataram I, Bray F (2024).Global Cancer Observatory: Cancer Today. Lyon, France: International Agency for Research on Cancer. Available from: https://gco.iarc.who.int/today, accessed [16.07.24]

Definiciones (solo disponible en inglÃ©s):	Indicence per 100,000

CÃ¡ncer de mama

Mujeres, 2022



Zona abarcada:	Nacional
Referencias:	Ferlay J, Ervik M, Lam F, Laversanne M, Colombet M, Mery L, Piñeros M, Znaor A, Soerjomataram I, Bray F (2024).Global Cancer Observatory: Cancer Today. Lyon, France: International Agency for Research on Cancer. Available from: https://gco.iarc.who.int/today, accessed [16.07.24]

Definiciones (solo disponible en inglÃ©s):	Incidence per 100,000

CÃ¡ncer colorrectal

Hombres, 2022

Edad:	20+
Zona abarcada:	Nacional
Referencias:	Ferlay J, Ervik M, Lam F, Laversanne M, Colombet M, Mery L, Piñeros M, Znaor A, Soerjomataram I, Bray F (2024).Global Cancer Observatory: Cancer Today. Lyon, France: International Agency for Research on Cancer. Available from: https://gco.iarc.who.int/today, accessed [16.07.24]
Definiciones (solo disponible en inglÃ©s):	Incidence per 100,000

Mujeres, 2022



Edad:	20+
Zona abarcada:	Nacional
Referencias:	Ferlay J, Ervik M, Lam F, Laversanne M, Colombet M, Mery L, Piñeros M, Znaor A, Soerjomataram I, Bray F (2024).Global Cancer Observatory: Cancer Today. Lyon, France: International Agency for Research on Cancer. Available from: https://gco.iarc.who.int/today, accessed [16.07.24]
Definiciones (solo disponible en inglÃ©s):	Incidence per 100,000

CÃ¡ncer de pÃ¡ncreas

Hombres, 2022

Edad:	20+
Zona abarcada:	Nacional
Referencias:	Ferlay J, Ervik M, Lam F, Laversanne M, Colombet M, Mery L, Piñeros M, Znaor A, Soerjomataram I, Bray F (2024).Global Cancer Observatory: Cancer Today. Lyon, France: International Agency for Research on Cancer. Available from: https://gco.iarc.who.int/today, accessed [16.07.24]
Definiciones (solo disponible en inglÃ©s):	Incidence per 100,000

Mujeres, 2022



Edad:	20+
Zona abarcada:	Nacional
Referencias:	Ferlay J, Ervik M, Lam F, Laversanne M, Colombet M, Mery L, Piñeros M, Znaor A, Soerjomataram I, Bray F (2024).Global Cancer Observatory: Cancer Today. Lyon, France: International Agency for Research on Cancer. Available from: https://gco.iarc.who.int/today, accessed [16.07.24]
Definiciones (solo disponible en inglÃ©s):	Incidence per 100,000

CÃ¡ncer de la vesÃcula biliar

Hombres, 2022



Edad:	20+
Zona abarcada:	Nacional
Referencias:	Ferlay J, Ervik M, Lam F, Laversanne M, Colombet M, Mery L, Piñeros M, Znaor A, Soerjomataram I, Bray F (2024).Global Cancer Observatory: Cancer Today. Lyon, France: International Agency for Research on Cancer. Available from: https://gco.iarc.who.int/today, accessed [16.07.24]
Definiciones (solo disponible en inglÃ©s):	Indicence per 100,000

Mujeres, 2022



Edad:	20+
Zona abarcada:	Nacional
Referencias:	Ferlay J, Ervik M, Lam F, Laversanne M, Colombet M, Mery L, Piñeros M, Znaor A, Soerjomataram I, Bray F (2024).Global Cancer Observatory: Cancer Today. Lyon, France: International Agency for Research on Cancer. Available from: https://gco.iarc.who.int/today, accessed [16.07.24]
Definiciones (solo disponible en inglÃ©s):	Indicence per 100,000

CÃ¡ncer de riÃ±Ã³n

Hombres, 2022



Edad:	20+
Zona abarcada:	Nacional

Referencias:	Ferlay J, Ervik M, Lam F, Laversanne M, Colombet M, Mery L, Piñeros M, Znaor A, Soerjomataram I, Bray F (2024).Global Cancer Observatory: Cancer Today. Lyon, France: International Agency for Research on Cancer. Available from: https://gco.iarc.who.int/today, accessed [16.07.24]
Definiciones (solo disponible en inglÃ©s):	Incidence per 100,000

Mujeres, 2022



Edad:	20+
Zona abarcada:	Nacional
Referencias:	Ferlay J, Ervik M, Lam F, Laversanne M, Colombet M, Mery L, Piñeros M, Znaor A, Soerjomataram I, Bray F (2024).Global Cancer Observatory: Cancer Today. Lyon, France: International Agency for Research on Cancer. Available from: https://gco.iarc.who.int/today, accessed [16.07.24]

Definiciones (solo disponible en inglÃ©s):	Incidence per 100,000

CÃ¡ncer de Ãºtero

Mujeres, 2022



Edad:	20+
Referencias:	Ferlay J, Ervik M, Lam F, Laversanne M, Colombet M, Mery L, Piñeros M, Znaor A, Soerjomataram I, Bray F (2024).Global Cancer Observatory: Cancer Today. Lyon, France: International Agency for Research on Cancer. Available from: https://gco.iarc.who.int/today, accessed [16.07.24]
Definiciones (solo disponible en inglÃ©s):	Incidence per 100,000

TensiÃ³n arterial elevada

Adultos, 2015



Referencias:	Global Health Observatory data repository, World Health Organisation, http://apps.who.int/gho/data/node.main.A875?lang=en
Definiciones (solo disponible en inglÃ©s):	Age Standardised estimated % Raised blood pressure 2015 (SBP>=140 OR DBP>=90).

Hombres, 2015



Referencias:	Global Health Observatory data repository, World Health Organisation, http://apps.who.int/gho/data/node.main.A875?lang=en
Definiciones (solo disponible en inglÃ©s):	Age Standardised estimated % Raised blood pressure 2015 (SBP>=140 OR DBP>=90).

Mujeres, 2015



Referencias:	Global Health Observatory data repository, World Health Organisation, http://apps.who.int/gho/data/node.main.A875?lang=en
Definiciones (solo disponible en inglÃ©s):	Age Standardised estimated % Raised blood pressure 2015 (SBP>=140 OR DBP>=90).

Colesterol elevado

Adultos, 2008



Referencias:	Global Health Observatory data repository, World Health Organisation, http://apps.who.int/gho/data/node.main.A885
Definiciones (solo disponible en inglÃ©s):	% Raised total cholesterol (>= 5.0 mmol/L) (age-standardized estimate).

Hombres, 2008



Referencias:	Global Health Observatory data repository, World Health Organisation, http://apps.who.int/gho/data/node.main.A885
Definiciones (solo disponible en inglÃ©s):	% Raised total cholesterol (>= 5.0 mmol/L) (age-standardized estimate).

Mujeres, 2008



Referencias:	Global Health Observatory data repository, World Health Organisation, http://apps.who.int/gho/data/node.main.A885
Definiciones (solo disponible en inglÃ©s):	% Raised total cholesterol (>= 5.0 mmol/L) (age-standardized estimate).

Glucemia en ayunas elevada

Hombres, 2014



Referencias:	Global Health Observatory data repository, World Health Organisation, http://apps.who.int/gho/data/node.main.A869?lang=en
Definiciones (solo disponible en inglÃ©s):	Age Standardised % raised fasting blood glucose (>= 7.0 mmol/L or on medication).

Mujeres, 2014



Referencias:	Global Health Observatory data repository, World Health Organisation, http://apps.who.int/gho/data/node.main.A869?lang=en
Definiciones (solo disponible en inglÃ©s):	Age Standardised % raised fasting blood glucose (>= 7.0 mmol/L or on medication).

Prevalencia de la diabetes

Adultos, 2024



Referencias: Reproduced with kind permission International Diabetes Federation. IDF Diabetes Atlas, 11th edn. Brussels, Belgium:International Diabetes Federation, 2025. http://www.diabetesatlas.org

Ovarian Cancer

Mujeres, 2022



Edad:	20+
Referencias:	Ferlay J, Ervik M, Lam F, Laversanne M, Colombet M, Mery L, Piñeros M, Znaor A, Soerjomataram I, Bray F (2024).Global Cancer Observatory: Cancer Today. Lyon, France: International Agency for Research on Cancer. Available from: https://gco.iarc.who.int/today, accessed [16.07.24]
Definiciones (solo disponible en inglÃ©s):	Incidence per 100,000

Leukemia

Hombres, 2022



Edad:	20+
Zona abarcada:	Nacional
Referencias:	Ferlay J, Ervik M, Lam F, Laversanne M, Colombet M, Mery L, Piñeros M, Znaor A, Soerjomataram I, Bray F (2024).Global Cancer Observatory: Cancer Today. Lyon, France: International Agency for Research on Cancer. Available from: https://gco.iarc.who.int/today, accessed [16.07.24]
Definiciones (solo disponible en inglÃ©s):	Incidence per 100,000

A menos que se indique lo contrario, el sobrepeso se refiere a un IMC entre 25Â kg y 29,9Â kg/mÂ² y la obesidad se refiere a un IMC superior a 30 kg/mÂ²..

Mujeres, 2022



Edad:	20+
Zona abarcada:	Nacional
Referencias:	Ferlay J, Ervik M, Lam F, Laversanne M, Colombet M, Mery L, Piñeros M, Znaor A, Soerjomataram I, Bray F (2024).Global Cancer Observatory: Cancer Today. Lyon, France: International Agency for Research on Cancer. Available from: https://gco.iarc.who.int/today, accessed [16.07.24]
Definiciones (solo disponible en inglÃ©s):	Incidence per 100,000

A menos que se indique lo contrario, el sobrepeso se refiere a un IMC entre 25Â kg y 29,9Â kg/mÂ² y la obesidad se refiere a un IMC superior a 30 kg/mÂ²..

Leukemia

Hombres, 2022



Edad:	20+
Zona abarcada:	Nacional
Referencias:	Ferlay J, Ervik M, Lam F, Laversanne M, Colombet M, Mery L, Piñeros M, Znaor A, Soerjomataram I, Bray F (2024).Global Cancer Observatory: Cancer Today. Lyon, France: International Agency for Research on Cancer. Available from: https://gco.iarc.who.int/today, accessed [16.07.24]
Definiciones (solo disponible en inglÃ©s):	Incidence per 100,000

A menos que se indique lo contrario, el sobrepeso se refiere a un IMC entre 25Â kg y 29,9Â kg/mÂ² y la obesidad se refiere a un IMC superior a 30 kg/mÂ²..

Mujeres, 2022



Edad:	20+
Zona abarcada:	Nacional
Referencias:	Ferlay J, Ervik M, Lam F, Laversanne M, Colombet M, Mery L, Piñeros M, Znaor A, Soerjomataram I, Bray F (2024).Global Cancer Observatory: Cancer Today. Lyon, France: International Agency for Research on Cancer. Available from: https://gco.iarc.who.int/today, accessed [16.07.24]
Definiciones (solo disponible en inglÃ©s):	Incidence per 100,000

A menos que se indique lo contrario, el sobrepeso se refiere a un IMC entre 25Â kg y 29,9Â kg/mÂ² y la obesidad se refiere a un IMC superior a 30 kg/mÂ²..

Liver and intrahepatic bile duct Cancer

Hombres, 2022



Edad:	20+
Zona abarcada:	Nacional

Referencias:	Ferlay J, Ervik M, Lam F, Laversanne M, Colombet M, Mery L, Piñeros M, Znaor A, Soerjomataram I, Bray F (2024).Global Cancer Observatory: Cancer Today. Lyon, France: International Agency for Research on Cancer. Available from: https://gco.iarc.who.int/today, accessed [16.07.24]
Definiciones (solo disponible en inglÃ©s):	Incidence per 100,000

Mujeres, 2022



Edad:	20+
Zona abarcada:	Nacional
Referencias:	Ferlay J, Ervik M, Lam F, Laversanne M, Colombet M, Mery L, Piñeros M, Znaor A, Soerjomataram I, Bray F (2024).Global Cancer Observatory: Cancer Today. Lyon, France: International Agency for Research on Cancer. Available from: https://gco.iarc.who.int/today, accessed [16.07.24]

Definiciones (solo disponible en inglÃ©s):	Incidence per 100,000

Multiple Myeloma

Hombres, 2022



Edad:	20+
Zona abarcada:	Nacional
Referencias:	Ferlay J, Ervik M, Lam F, Laversanne M, Colombet M, Mery L, Piñeros M, Znaor A, Soerjomataram I, Bray F (2024).Global Cancer Observatory: Cancer Today. Lyon, France: International Agency for Research on Cancer. Available from: https://gco.iarc.who.int/today, accessed [16.07.24]
Definiciones (solo disponible en inglÃ©s):	Indicence per 100,000

A menos que se indique lo contrario, el sobrepeso se refiere a un IMC entre 25Â kg y 29,9Â kg/mÂ² y la obesidad se refiere a un IMC superior a 30 kg/mÂ²..

Mujeres, 2022



Edad:	20+
Zona abarcada:	Nacional
Referencias:	Ferlay J, Ervik M, Lam F, Laversanne M, Colombet M, Mery L, Piñeros M, Znaor A, Soerjomataram I, Bray F (2024).Global Cancer Observatory: Cancer Today. Lyon, France: International Agency for Research on Cancer. Available from: https://gco.iarc.who.int/today, accessed [16.07.24]
Definiciones (solo disponible en inglÃ©s):	Indicence per 100,000

A menos que se indique lo contrario, el sobrepeso se refiere a un IMC entre 25Â kg y 29,9Â kg/mÂ² y la obesidad se refiere a un IMC superior a 30 kg/mÂ²..

Non Hodgkin Lymphoma

Hombres, 2022



Edad:	20+
Zona abarcada:	Nacional

Referencias:	Ferlay J, Ervik M, Lam F, Laversanne M, Colombet M, Mery L, Piñeros M, Znaor A, Soerjomataram I, Bray F (2024).Global Cancer Observatory: Cancer Today. Lyon, France: International Agency for Research on Cancer. Available from: https://gco.iarc.who.int/today, accessed [16.07.24]
Definiciones (solo disponible en inglÃ©s):	Incidence per 100,000

A menos que se indique lo contrario, el sobrepeso se refiere a un IMC entre 25Â kg y 29,9Â kg/mÂ² y la obesidad se refiere a un IMC superior a 30 kg/mÂ²..

Mujeres, 2022



Edad:	20+
Zona abarcada:	Nacional
Referencias:	Ferlay J, Ervik M, Lam F, Laversanne M, Colombet M, Mery L, Piñeros M, Znaor A, Soerjomataram I, Bray F (2024).Global Cancer Observatory: Cancer Today. Lyon, France: International Agency for Research on Cancer. Available from: https://gco.iarc.who.int/today, accessed [16.07.24]

Definiciones (solo disponible en inglÃ©s):	Incidence per 100,000

A menos que se indique lo contrario, el sobrepeso se refiere a un IMC entre 25Â kg y 29,9Â kg/mÂ² y la obesidad se refiere a un IMC superior a 30 kg/mÂ²..

Thyroid Cancer

Hombres, 2022



Edad:	20+
Zona abarcada:	Nacional

Referencias:	Ferlay J, Ervik M, Lam F, Laversanne M, Colombet M, Mery L, Piñeros M, Znaor A, Soerjomataram I, Bray F (2024).Global Cancer Observatory: Cancer Today. Lyon, France: International Agency for Research on Cancer. Available from: https://gco.iarc.who.int/today, accessed [16.07.24]
Definiciones (solo disponible en inglÃ©s):	Incidence per 100,000

Mujeres, 2022



Edad:	20+
Zona abarcada:	Nacional
Referencias:	Ferlay J, Ervik M, Lam F, Laversanne M, Colombet M, Mery L, Piñeros M, Znaor A, Soerjomataram I, Bray F (2024).Global Cancer Observatory: Cancer Today. Lyon, France: International Agency for Research on Cancer. Available from: https://gco.iarc.who.int/today, accessed [16.07.24]

Definiciones (solo disponible en inglÃ©s):	Incidence per 100,000

PDF created on July 19, 2025