



Kolumbie



Country report card - adults

This report card contains the latest data available on the Global Obesity Observatory on overweight and obesity for adults. Where available, data on common and relevant obesity drivers and comorbidities are also presented.

View the latest version of this report on the Global Obesity Observatory at <https://data.worldobesity.org/country/colombia-43/>.

Riziko nãjrodnã obezity ***7,5/10** This is a composite â[] obesity riskâ[] score (out of 10, the highest risk) based on obesity prevalence, rate of increase, likelihood of meeting the 2025 target, treatment indicator and childhood stunting levels. Riziko dã[] tská© obezity ***6,5/11** This is a â[] risk scoreâ[] for each countryâ[] s likelihood of having or acquiring a major childhood obesity problem during the 2020s, taking account of current prevalence levels and risk for future obesity (based on stunting among infants, maternal obesity, maternal smoking, and breastfeeding rates).

* Na zãjkladã[] odhadovanã½ch dat. Dalãjã informace najdete vã sekci Publikace

Prevalence obesity

Dospělí I, 2018



Typ
průzkumu:

Naměřeno en

Věk k:

18-75

Velikost
vzorku:

1537

**Pokrytí
oblast:**


Má stská©

Reference: Jimenez-Mora, Mario A et al. "Association of Overweight, Obesity and Abdominal Obesity with Socioeconomic Status and Educational Level in Colombia." Diabetes, metabolic syndrome and obesity : targets and therapy vol. 13 1887-1898. 3 Jun. 2020, doi:10.2147/DMSO.S244761

Pokud není uvedeno jinak, nadvěha znamená BMI mezi 25 a 29,9 kg/m², obezita znamená BMI vyšší než 30 kg/m².

% Adults living with obesity in Colombia, 2004-2015

Å½eny



Typ
prÅ½kumu:

NamÅ½ enÅ½


Reference:

2004: Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Encuesta Nacional de la Situaci3n Nutricional (ENSIN), 2005. (2006). Available at: https://www.icbf.gov.co/sites/default/files/libro_2005.pdf [Accessed 18.07.25]
2010: ENSIN 2010. Available at <https://www.minsalud.gov.co/> (last accessed 05.10.20)
2015: ENSIN 2015. Available at <https://www.minsalud.gov.co/> (last accessed 05.10.20)

Pokud není uvedeno jinak, nadváha znamená BMI mezi 25 a 29,9 kg/m², obezita znamená BMI vyšší než 30 kg/m².

Ke shromažďování těchto údajů mohly být použity různé metodiky, a proto nemusí být údaje z různých průzkumů vzájemně plně srovnatelné. Použité metodiky viz původní zdroje údajů

MuÅ¾i



Typ
prÅ¾zkumu:

NamÅ¾ Å enÅ©


Reference:

2004: Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Encuesta Nacional de la Situaci3n Nutricional (ENSIN), 2005. (2006). Available at: https://www.icbf.gov.co/sites/default/files/libro_2005.pdf [Accessed 18.07.25]
2010: ENSIN 2010. Available at <https://www.minsalud.gov.co/> (last accessed 05.10.20)
2015: ENSIN 2015. Available at <https://www.minsalud.gov.co/> (last accessed 05.10.20)

Pokud nenÅ uvedeno jinak, nadvÅha znamenÅ BMI mezi 25Å aÅ 29,9Å kg/mÅ², obezita znamenÅ BMI vyÅÅÅ neÅ¼ 30Å kg/mÅ².

Ke shromaÅovÅnÅ tÅ chto ÅdajÅ mohly bÅt pouÅity rÅznÅ metodiky, a proto nemusÅ bÅt Ådaje z rÅznÅch prÅzkumÅ vÅdy plnÅ srovnatelnÅ. PouÅitÅ metodiky viz pÅvodnÅ zdroje ÅdajÅ

Men and women



**Typ
průzkumu:**

Naměřeno en

Reference:


2004: Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Encuesta Nacional de la Situación Nutricional (ENSIN), 2005. (2006). Available at: https://www.icbf.gov.co/sites/default/files/libro_2005.pdf [Accessed 18.07.25]
2010: ENSIN 2010. Available at <https://www.minsalud.gov.co/> (last accessed 05.10.20)
2015: ENSIN 2015. Available at <https://www.minsalud.gov.co/> (last accessed 05.10.20)

Pokud není uvedeno jinak, nadvěšha znamená BMI mezi 25 a 29,9 kg/m², obezita znamená BMI vyšší než 30 kg/m².

Ke shromažďování těchto údajů mohly být použity různé metodiky, a proto nemusí být údaje z různých průzkumů vždy plně srovnatelné. Použité metodiky viz původní zdroje údajů

% Adults living with overweight or obesity in Colombia, 2004-2015

Å½eny



Typ
prÅ½kumu:


NamÅ½ Å½ enÅ½©

Reference: 2004: Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Encuesta Nacional de la Situación Nutricional (ENSIN), 2005. (2006). Available at: https://www.icbf.gov.co/sites/default/files/libro_2005.pdf [Accessed 18.07.25]
2010: ENSIN 2010. Available at <https://www.minsalud.gov.co/> (last accessed 05.10.20)
2015: ENSIN 2015. Available at <https://www.minsalud.gov.co/> (last accessed 05.10.20)

Pokud není uvedeno jinak, nadvěřha znamená BMI mezi 25 a 29,9 kg/m², obezita znamená BMI vyšší než 30 kg/m².

Ke shromažďování těchto údajů mohly být použity různé metodiky, a proto nemusí být údaje z různých průzkumů vždy plně srovnatelné. Použité metodiky viz původní zdroje údajů

MuÅ¾i

Typ
prÅ¾kumu:


NamÅ¡ enÅ©

Reference: 2004: Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Encuesta Nacional de la Situaci3n Nutricional (ENSIN), 2005. (2006). Available at: https://www.icbf.gov.co/sites/default/files/libro_2005.pdf [Accessed 18.07.25]
2010: ENSIN 2010. Available at <https://www.minsalud.gov.co/> (last accessed 05.10.20)
2015: ENSIN 2015. Available at <https://www.minsalud.gov.co/> (last accessed 05.10.20)

Pokud nenÅ uvedeno jinak, nadvÅha znamenÅ BMI mezi 25Å aÅ 29,9Å kg/mÅ², obezita znamenÅ BMI vyÅÅÅ neÅ¼ 30Å kg/mÅ².

Ke shromaÅovÅnÅ tÅ chto ÅdajÅ mohly bÅt pouÅity rÅznÅ metodiky, a proto nemusÅ bÅt Ådaje z rÅznÅch prÅzkumÅ vÅdy plnÅ srovnatelnÅ. PouÅitÅ metodiky viz pÅvodnÅ zdroje ÅdajÅ

Men and women



**Typ
průzkumu:**

Naměřeno en

Reference:


2004: Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Encuesta Nacional de la Situación Nutricional (ENSIN), 2005. (2006). Available at: https://www.icbf.gov.co/sites/default/files/libro_2005.pdf [Accessed 18.07.25]
2010: ENSIN 2010. Available at <https://www.minsalud.gov.co/> (last accessed 05.10.20)
2015: ENSIN 2015. Available at <https://www.minsalud.gov.co/> (last accessed 05.10.20)

Pokud není uvedeno jinak, nadvěšha znamená BMI mezi 25 a 29,9 kg/m², obezita znamená BMI vyšší než 30 kg/m².

Ke shromažďování těchto údajů mohly být použity různé metodiky, a proto nemusí být údaje z různých průzkumů vždy plně srovnatelné. Použité metodiky viz původní zdroje údajů

% Adults living with obesity in selected countries in the Americas Region 1960-2018, vybrané země

Muži




Reference:

- 1960, 1971, 1973, 1976, 1991: Flegal KM, Carroll MD, Kuczmarski RJ, Johnson CL. Overweight and obesity in the United States: prevalence and trends, 1960-1994. *International Journal of Obesity* (1998);22:39-47
- 1975: Monteiro CA, Conde WL, Popking BM. Is obesity replacing or adding to undernutrition? Evidence from different social classes in Brazil. 2002. *Public Health Nutrition*:51(1A), 105-112
- 1988: Berrios X, Jadue I, Zenteno J, Ross MI, Rodriguez H. Prevalencia de factores de riesgo para enfermedades crónicas. Estudio de la población general de la región Metropolitana, 1986-1987. *Rev. Med. Chile.* 1990;118:597-604
- 1992: Uauy R, Albal C, Kain J. Obesity Trends in Latin America: Transiting from Under-to Overweight. *Journal of Nutrition* 2001;131:S893-S899
- 1994, 1995: Martorell R, Khan LK, Hughes ML, Grummer Strawn LM. Obesity in women from developing countries. *EJCN* (2000) 54;247-252
- 1997: Filozof C, Gonzales C, Sereday M, Mazza C, Braguinsky J. Obesity prevalence and trends in Latin American countries. *Obesity Reviews*, 2001;2:99-196
- 1998: Instituto Nacional de Estadística - INE/Guatemala and Macro International. 1999. Guatemala Encuesta Nacional de Salud Materno Infantil 1998-1999. Calverton, Maryland, USA: Instituto Nacional de Estadística - INE/Guatemala and Macro International.
- 1999: Centres for Disease Control and Prevention. <http://www.cdc.gov/>
- 2000: Personal Communication from Dr C Sanchez Castillio, Body Mass Index cutoff points for Type 2 Diabetes Mellitus and Hypertension in the Mexican National Health Survey 2000.
- 2001: Ogden CL, Carroll MD, Curtin LR, McDowell MA, Tabak CJ, Flegal KM. Prevalence of Overweight and Obesity in the United States, 1999-2004. *JAMA* 2006;295(13):1549-1555
- 2002: Monteiro CA, Conde WL and Popkin BA. (2007). Income-specific trends in obesity in Brazil: 1975 - 2003. *American Journal of Public Health*, 97 (10): 1808 - 1812.
- 2003: 2003 ENS Report. Final results on the National Health Survey. [Http://epi.minsal.cl/epi/html/invest/ENS/informeFinalENS.pdf](http://epi.minsal.cl/epi/html/invest/ENS/informeFinalENS.pdf).
- 2004: Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Encuesta Nacional de la Situación Nutricional (ENSIN), 2005. (2006). Available at: https://www.icbf.gov.co/sites/default/files/libro_2005.pdf [Accessed 18.07.25]
- 2005: Cayemittes, Michel, Marie Florence Placide, Soumaïla Mariko, Bernard Barrère, Blaise Sévère, and Canez Alexandre. 2007. Enquête Mortalité, Morbidité et Utilisation des Services, Haïti, 2005-2006. Calverton, Maryland, USA: Ministère de la Santé Publique et de la Population, Institut Haïtien de l'Enfance and Macro International.
- 2006: Olaiz-Fernández G, Rivera-Dommarco J, Shamah-Levy T, Rojas R, Villalpando-Hernández S, Hernández-Avila M, Sepúlveda-Amor J. Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2006. Cuernavaca, México: Instituto Nacional de Salud Pública, 2006. (National Health and Nutrition Survey 2006).
- 2007: Flegal KM, Carroll MD, Ogden CL and Curtin LR. (2010). Prevalence and trends in obesity among US adults, 1999-2008. *Journal of the American Medical Association*, 303 (3): 235 - 241.
- 2008: Ramirez-Zea M, Kroker-Lobos MF, Close-Fernandez R, Kanter R. The double burden of malnutrition in indigenous and nonindigenous Guatemalan populations. *Am J Clin Nutr.* 2014 Dec;100(6):1644S-51S. doi: 10.3945/ajcn.114.083857
- 2009: NHANES Survey - Published in Flegal KM, Carroll MD, Kit BK, Ogden CL. Prevalence of Obesity and Trends in the Distribution of Body Mass Index Among US Adults, 1999-2010. *JAMA* Published online January 17, 2012. doi: 10.1001/jama.2012.39
- 2010: ENSIN 2010. Available at <https://www.minsalud.gov.co/> (last accessed 05.10.20)
- 2011: Ruopeng An, "Prevalence and Trends of Adult Obesity in the US, 1999-2012", *ISRN Obesity*, vol. 2014, Article ID 185132, 6 pages, 2014. doi:10.1155/2014/185132
- 2012: Cayemittes, Michel, Michelle Fatuma Busangu, Jean de Dieu Bizimana, Bernard Barrère, Blaise Sévère, Viviane Cayemittes and Emmanuel Charles. 2013. Enquête Mortalité, Morbidité et Utilisation des Services, Haïti, 2012. Calverton, Maryland, USA: Ministère de la Santé Publique et de la Population - MSP/Haïti, l'Institut Haïtien de l'Enfance - IHE, and ICF International.
- 2013: FERREIRA, Arthur Pate de Souza; SZWARCOWALD, Célia Landmann and DAMACENA, Giseli Nogueira. Prevalence of obesity and associated factors in the Brazilian population: a study of data from the 2013 National Health Survey. *Rev. bras. epidemiol.* [online]. 2019, vol.22 [cited 2019-05-16], e190024. Available from: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-790X2019000100420&lng=en&nrm=iso. Epub Apr 01, 2019. ISSN 1415-790X. <http://dx.doi.org/10.1590/1980-549720190024>.
- 2014: Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social - MSPAS/Guatemala, Instituto Nacional de Estadística - INE/Guatemala, Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia - Segeplán/Guatemala and ICF International. 2017. Encuesta Nacional de Salud Materno Infantil 2014-2015: Informe Final. Rockville, Maryland, USA: MSPAS, INE, Segeplán and ICF International.
- 2015: ENSIN 2015. Available at <https://www.minsalud.gov.co/> (last accessed 05.10.20)
- 2016: Encuesta Nacional de Salud y Nutrición de Medio Camino 2016
- 2017: Reanalysis of NHANES 2017/18 by Rachel Jackson Leach, Jaynaide Powis World Obesity Federation
- 2018: 4th National Survey, Full report available at http://www.msal.gob.ar/images/stories/bes/graficos/0000001622cnt-2019-10_4ta-encuesta-nacional-factores-riesgo.pdf (last accessed 29.04.20)
- 2019: Pesquisa nacional de saúde : 2019 : ciclos de vida : Brasil / IBGE, Coordenação de Trabalho e Rendimento. - Rio de Janeiro : IBGE, 2021. Available at <https://www.ibge.gov.br/en/statistics/social/health/16840-national-survey-of-health.html?=&t=resultados> (last accessed 04.04.23)
- 2020: INEI (2021) Peru Encuesta Demográfica y de Salud Familiar Endes 2020. Available at https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib1795/ (last accessed 28.03.23)
- 2021: Shamah-Levy T, Romero-Martínez M, Barrientos-Gutiérrez T, Cuevas-Nasu L, Bautista-Arredondo S, Colchero MA, Gaona-Pineda EB, Lazcano-Ponce E, Martínez-Barnette J, Alpuche-Arana C, Rivera-Dommarco J. Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2021 sobre Covid-19. Resultados nacionales. Cuernavaca, México: Instituto Nacional de Salud Pública, 2022. <https://ensanut.insp.mx/encuestas/ensanutcontinua2021/informes.php> (Accessed 03.01.2023)
- 2022: Perú: Encuesta Demográfica y de Salud Familiar 2022 - Nacional y Departamental. Available at <https://www.gob.pe/institucion/inei/informes-publicaciones/4233597-peru-encuesta-demografica-y-de-salud-familiar-endes-2022>
- 2023: Shamah-Levy T, Lazcano-Ponce E, Cuevas-Nasu L, Romero-Martínez M, Gaona-Pineda EB, Gómez-Acosta JM,

Ke shromažďování těchto údajů mohly být použity různé metodiky, a proto nemusí být údaje z různých průzkumů vždy plně srovnatelné. Použití metodiky viz původní zdroje údajů

A¹/₂eny




Reference: 1960, 1971, 1973, 1976, 1991: Flegal KM, Carroll MD, Kuczmarski RJ, Johnson CL. Overweight and obesity in the United States: prevalence and trends, 1960-1994. *International Journal of Obesity* (1998);22:39-47
1975: Monteiro CA, Conde WL, Popking BM. Is obesity replacing or adding to undernutrition? Evidence from different social classes in Brazil. 2002. *Public Health Nutrition*:51(1A), 105-112
1988: Berrios X, Jadue I, Zenteno J, Ross MI, Rodriguez H. Prevalencia de factores de riesgo para enfermedades cronicas. Estudio de la poblacion general de la region Metropolitana, 1986-1987. *Rev. Med. Chile*. 1990;118:597-604
1992: Uauy R, Albal C, Kain J. Obesity Trends in Latin America: Transiting from Under-to Overweight. *Journal of Nutrition* 2001;131:S893-S899
1994, 1995: Martorell R, Khan LK, Hughes ML, Grummer Strawn LM. Obesity in women from developing countries. *EJCN* (2000) 54;247-252
1997: Filozof C, Gonzales C, Sereday M, Mazza C, Braguinsky J. Obesity prevalence and trends in Latin American countries. *Obesity Reviews*, 2001;2:99-196
1998: Instituto Nacional de Estadística - INE/Guatemala and Macro International. 1999. *Guatemala Encuesta Nacional de*

Ke shromažďování těchto údajů mohly být použity různé metodiky, a proto nemusí být údaje z různých průzkumů vždy plně srovnatelné. Použité metodiky viz původní zdroje údajů

Nadváha/obezita podle vzdání látná

Dospáná lá, 2018

Typ
pránzkumu:

Námáná ená©

Ván k:

18-75

Velikost
vzorku:

1537

**Pokrytí
oblast:**


Má stská©

Reference: Jimenez-Mora, Mario A et al. "Association of Overweight, Obesity and Abdominal Obesity with Socioeconomic Status and Educational Level in Colombia." Diabetes, metabolic syndrome and obesity : targets and therapy vol. 13 1887-1898. 3 Jun. 2020, doi:10.2147/DMSO.S244761

Pokud není uvedeno jinak, nadvěha znamená BMI mezi 25 a 29,9 kg/m², obezita znamená BMI vyšší než 30 kg/m².

Nadváha/obezita podle věku

Dospělí, 2018



Typ
průzkumu:

Naměřeno en

Velikost
vzorku:

1537

Pokrytí
oblasti:

Místní státní


Reference:

Jimenez-Mora, Mario A et al. "Association of Overweight, Obesity and Abdominal Obesity with Socioeconomic Status and Educational Level in Colombia." Diabetes, metabolic syndrome and obesity : targets and therapy vol. 13 1887-1898. 3 Jun. 2020, doi:10.2147/DMSO.S244761

Pokud není uvedeno jinak, nadváha znamená BMI mezi 25 a 29,9 kg/m², obezita znamená BMI vyšší než 30 kg/m².

Nadváha/obezita podle regionu

Dospělí I, 2018



Typ
průzkumu:

Naměřeno en

Věk k:

18-75

Velikost
vzorku:

1537

**Pokrytí
oblast:**


Má stská©

Reference: Jimenez-Mora, Mario A et al. "Association of Overweight, Obesity and Abdominal Obesity with Socioeconomic Status and Educational Level in Colombia." Diabetes, metabolic syndrome and obesity : targets and therapy vol. 13 1887-1898. 3 Jun. 2020, doi:10.2147/DMSO.S244761

Pokud není uvedeno jinak, nadvěha znamená BMI mezi 25 a 29,9 kg/m², obezita znamená BMI vyšší než 30 kg/m².

Nadváha/obezita podle sociálně-ekonomické skupiny

Dospělí, 2018

Typ
průzkumu:

Naměřeno en

Věk:

18-75

Velikost
vzorku:

1537

Pokrytí
oblasti:

Místní

Reference:


Jimenez-Mora, Mario A et al. "Association of Overweight, Obesity and Abdominal Obesity with Socioeconomic Status and Educational Level in Colombia." Diabetes, metabolic syndrome and obesity : targets and therapy vol. 13 1887-1898. 3 Jun. 2020, doi:10.2147/DMSO.S244761

Pokud není uvedeno jinak, nadváha znamená BMI mezi 25 a 29,9 kg/m², obezita znamená BMI vyšší než 30 kg/m².

NadvĚha/obezita podle etnickĚho pĚvodu

Ethnic groups are as defined by publication of origin and are not as defined by WOF. In some instances ethnicity is conflated with nationality and/or race.

Dospělí I, 2015-2016



**Typ
průzkumu:**

Námětí a en

Věk k:

18-64

**Velikost
vzorku:**

74,200

**Pokrytí
oblast:**

Národní


Reference:

Libro ENSIN 2015. Available at: <https://www.minsalud.gov.co/> [Accessed 18.07.25]

Pokud není uvedeno jinak, nadávka znamená BMI mezi 25 a 29,9 kg/m², obezita znamená BMI vyšší než 30 kg/m².

Double burden of underweight & overweight

Dospělí I, 2022



Typ
průzkumu:

Naměřeno en

Věk:

20+

Reference:

NCD Risk Factor Collaboration (NCD-RisC). Worldwide trends in underweight and obesity from 1990 to 2022: a pooled analysis of 3663 population representative studies with 222 million children, adolescents, and adults. Lancet 2024; published online Feb 29. [https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(23\)02750-2](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(23)02750-2).

Poznámky:


Age Standardised estimates

Definice
(k dispozici
pouze
v angličtině):

Combined prevalence of BMI<18.5 kg/m² and BMI≥30 kg/m² (double burden of underweight and obesity)

Nedostatečnā nā fyzickā aktivita

Dospā Iā, 2022

Typ
průzkumu:

Samohlášení

Věk:

18+

Pokrytí
oblasti:

Národní


Reference:

WHO (2024). Prevalence of insufficient physical activity among adults aged 18-years age-standardized estimate in 2022. Available at [https://www.who.int/data/gho/data/indicators/indicator-details/GHO/prevalence-of-insufficient-physical-activity-among-adults-aged-18-years-\(age-standardized-estimate\)-\(-\)](https://www.who.int/data/gho/data/indicators/indicator-details/GHO/prevalence-of-insufficient-physical-activity-among-adults-aged-18-years-(age-standardized-estimate)-(-))

Definice
(k dispozici
pouze
v angličtině):

Percent of population attaining less than 150 minutes of moderate-intensity physical activity per week, or less than 75 minutes of vigorous-intensity physical activity per week, or equivalent.

Muži, 2022

Typ
průzkumu:

Samohláskový

Věk:

18+

Pokrytí
oblast:


Národní

Reference:

WHO (2024). Prevalence of insufficient physical activity among adults aged 18-years age-standardized estimate in 2022. Available at [https://www.who.int/data/gho/data/indicators/indicator-details/GHO/prevalence-of-insufficient-physical-activity-among-adults-aged-18-years-\(age-standardized-estimate\)-\(-\)](https://www.who.int/data/gho/data/indicators/indicator-details/GHO/prevalence-of-insufficient-physical-activity-among-adults-aged-18-years-(age-standardized-estimate)-(-))

Definice
(k dispozici
pouze
v angličtině):

Percent of population attaining less than 150 minutes of moderate-intensity physical activity per week, or less than 75 minutes of vigorous-intensity physical activity per week, or equivalent.

A¹/₂eny, 2022

Typ prázku: Samonahľá;en¹/₂

Věk: 18+


Pokrytí oblast: Nírodn

Reference: WHO (2024). Prevalence of insufficient physical activity among adults aged 18-years age-standardized estimate in 2022. Available at [https://www.who.int/data/gho/data/indicators/indicator-details/GHO/prevalence-of-insufficient-physical-activity-among-adults-aged-18-years-\(age-standardized-estimate\)-\(-\)](https://www.who.int/data/gho/data/indicators/indicator-details/GHO/prevalence-of-insufficient-physical-activity-among-adults-aged-18-years-(age-standardized-estimate)-(-))

Definice (k dispozici pouze v angličtině): Percent of population attaining less than 150 minutes of moderate-intensity physical activity per week, or less than 75 minutes of vigorous-intensity physical activity per week, or equivalent.

Estimated per capita fruit intake

Dospělí, 2017



Typ
průzkumu:

Naměřeno en

Věk k:

25+


Reference:

Global Burden of Disease, the Institute for Health Metrics and Evaluation <http://ghdx.healthdata.org/>

Definice
(k dispozici
pouze
v angličtině):

Estimated per-capita fruit intake (g/day)

Odhadovaná polovina zpracované masa na osobu Dospělí, 2017



Typ
průzkumu:

Naměřeno en

Věk:

25+

Reference:


Global Burden of Disease, the Institute for Health Metrics and Evaluation <http://ghdx.healthdata.org/>

Definice
(k dispozici
pouze
v angličtině):

Estimated per-capita processed meat intake (g per day)

Estimated per capita whole grains intake

Dospělí, 2017



Typ
průzkumu:

Naměřeno en

Věk:

25+

Reference:


Global Burden of Disease, the Institute for Health Metrics and Evaluation <http://ghdx.healthdata.org/>

Definice
(k dispozici
pouze
v angličtině):

Estimated per-capita whole grains intake (g/day)

DuÅ¡evnÄ zdravÄ â stavy deprese

DospÄ lÄ, 2021



VÄ k:

20+


PokrytÄ oblast:

NÄrodnÄ

Reference: Institute for Health Metrics and Evaluation (IHME). GBD Compare Data Visualization. Global Burden of Disease (GBD) Study 2021. Seattle, WA: IHME, University of Washington, 2023. Available from <http://vizhub.healthdata.org/gbd-compare>. (Last accessed 23.04.25)

Definice
(kÅ dispozici
pouze
vÅ angliÄ
tinÄ): Number living with depression per 100,000 population (adults 20+ years)

MuÅ¾i, 2021



VÄ¼ k:

20+

PokrytÄ½
oblast:

NÄ½rodnÄ½


Reference:

Institute for Health Metrics and Evaluation (IHME). GBD Compare Data Visualization. Global Burden of Disease (GBD) Study 2021. Seattle, WA: IHME, University of Washington, 2023. Available from <http://vizhub.healthdata.org/gbd-compare>. (Last accessed 23.04.25)

Definice
(kÅ dispozici
pouze
vÅ angliÄ
tinÄ)::

Number living with depression per 100,000 population (adults 20+ years)

1/2eny, 2021



VÄ k:

20+

Pokryt
oblast:

NÄ;rodnÄ

Reference:


Institute for Health Metrics and Evaluation (IHME). GBD Compare Data Visualization. Global Burden of Disease (GBD) Study 2021. Seattle, WA: IHME, University of Washington, 2023. Available from <http://vizhub.healthdata.org/gbd-compare>. (Last accessed 23.04.25)

Definice
(kÅ dispozici
pouze
vÅ angliÄ
tinÄ):

Number living with depression per 100,000 population (adults 20+ years)

DuÅ¡evnÄ zdravÄ Ästavy Äzkosti

DospÄlÄ, 2021



VÄk:

20+


Reference:

Institute for Health Metrics and Evaluation (IHME). GBD Compare Data Visualization. Global Burden of Disease (GBD) Study 2021. Seattle, WA: IHME, University of Washington, 2023. Available from <http://vizhub.healthdata.org/gbd-compare>. (Last accessed 23.04.25).

Definice
(kÅ dispozici
pouze
vÅ angliÄ
tinÄ)::

Number living with anxiety per 100,000 population

MuÅ¾i, 2021



VÄ¼ k:

20+


Reference:

Institute for Health Metrics and Evaluation (IHME). GBD Compare Data Visualization. Global Burden of Disease (GBD) Study 2021. Seattle, WA: IHME, University of Washington, 2023. Available from <http://vizhub.healthdata.org/gbd-compare>. (Last accessed 23.04.25).

Definice
(kÅ dispozici
pouze
vÅ angliÄ
tinÄ)::

Number living with anxiety per 100,000 population

Å½eny, 2021



VÄ k:

20+

Reference:


Institute for Health Metrics and Evaluation (IHME). GBD Compare Data Visualization. Global Burden of Disease (GBD) Study 2021. Seattle, WA: IHME, University of Washington, 2023. Available from <http://vizhub.healthdata.org/gbd-compare>. (Last accessed 23.04.25).

Definice
(kÅ dispozici
pouze
vÅ angliÄ
tinÄ)::

Number living with anxiety per 100,000 population

Percent of population who cannot afford a healthy diet

Dospělí IČ, 2022



Pokrytí
oblast:


Národní

Reference:

The Food Systems Dashboard. The Global Alliance for Improved Nutrition (GAIN), The Columbia Climate School, and Cornell University College of Agriculture and Life Sciences. 2024. Geneva, Switzerland.
<https://www.foodsystemsdashboard.org>. DOI: <https://doi.org/10.36072/db>.

Rakovina jĀcnu

MuĀ¾i, 2022




VĀĭ k: 20+

PokrytĀĭ oblast: NĀĭrodnĀĭ

Reference: Ferlay J, Ervik M, Lam F, Laversanne M, Colombet M, Mery L, Piñeros M, Znaor A, Soerjomataram I, Bray F (2024). Global Cancer Observatory: Cancer Today. Lyon, France: International Agency for Research on Cancer. Available from: <https://gco.iarc.who.int/today>, accessed [16.07.24]

Definice (kĀ dispozici pouze vĀ angliĀĭ tinĀĭ): Indicence per 100,000

Ā½eny, 2022



VĀ k: 20+


PokrytĀ oblast: NĀrodnĀ

Reference: Ferlay J, Ervik M, Lam F, Laversanne M, Colombet M, Mery L, Piñeros M, Znaor A, Soerjomataram I, Bray F (2024).Global Cancer Observatory: Cancer Today. Lyon, France: International Agency for Research on Cancer. Available from: <https://gco.iarc.who.int/today>, accessed [16.07.24]

Definice (kĀ dispozici pouze vĀ angliĀ tinĀ): Indicence per 100,000

Rakovina prsu

Ženy, 2022

Pokrytí
oblast:

Národní

Reference:


Ferlay J, Ervik M, Lam F, Laversanne M, Colombet M, Mery L, Piñeros M, Znaor A, Soerjomataram I, Bray F (2024). Global Cancer Observatory: Cancer Today. Lyon, France: International Agency for Research on Cancer. Available from: <https://gco.iarc.who.int/today>, accessed [16.07.24]

Definice
(ká dispozici
pouze
vã angličtině):

Incidence per 100,000

Rakovina tlustáho stáňa eva a koneä nãku

Muã¾i, 2022




Vã¾ k: 20+

Pokrytã¾ oblast: Nã¾rodnã¾

Reference: Ferlay J, Ervik M, Lam F, Laversanne M, Colombet M, Mery L, Piñeros M, Znaor A, Soerjomataram I, Bray F (2024). Global Cancer Observatory: Cancer Today. Lyon, France: International Agency for Research on Cancer. Available from: <https://gco.iarc.who.int/today>, accessed [16.07.24]

Definice (kã dispozici pouze vã angliã¾ tinã¾): Incidence per 100,000

Ā½eny, 2022



VĀĳ k: 20+


PokrytĀĳ oblast: NĀĳrodnĀĳ

Reference: Ferlay J, Ervik M, Lam F, Laversanne M, Colombet M, Mery L, Piñeros M, Znaor A, Soerjomataram I, Bray F (2024).Global Cancer Observatory: Cancer Today. Lyon, France: International Agency for Research on Cancer. Available from: <https://gco.iarc.who.int/today>, accessed [16.07.24]

Definice (kĀ dispozici pouze vĀ angliĀĳ tinĀĳ): Incidence per 100,000

Rakovina slinivky bÄ iÄnÄ

MuÄ¾i, 2022




VÄ k: 20+

PokrytÄ oblast: NÄrodnÄ

Reference: Ferlay J, Ervik M, Lam F, Laversanne M, Colombet M, Mery L, Piñeros M, Znaor A, Soerjomataram I, Bray F (2024). Global Cancer Observatory: Cancer Today. Lyon, France: International Agency for Research on Cancer. Available from: <https://gco.iarc.who.int/today>, accessed [16.07.24]

Definice (kÄ dispozici pouze vÄ angliÄ tinÄ): Incidence per 100,000

1/2eny, 2022



VÄ k: 20+


PokrytÄ oblast: NÄrodnÄ

Reference: Ferlay J, Ervik M, Lam F, Laversanne M, Colombet M, Mery L, Piñeros M, Znaor A, Soerjomataram I, Bray F (2024).Global Cancer Observatory: Cancer Today. Lyon, France: International Agency for Research on Cancer. Available from: <https://gco.iarc.who.int/today>, accessed [16.07.24]

Definice Incidence per 100,000
(kÄ dispozici
pouze
vÄ angliÄ
tinÄ):

Rakovina ĎluĎ nĎku

MuĎi, 2022




VĎ k: 20+

PokrytĎ oblast: NĎrodnĎ

Reference: Ferlay J, Ervik M, Lam F, Laversanne M, Colombet M, Mery L, Piñeros M, Znaor A, Soerjomataram I, Bray F (2024). Global Cancer Observatory: Cancer Today. Lyon, France: International Agency for Research on Cancer. Available from: <https://gco.iarc.who.int/today>, accessed [16.07.24]

Definice (kĎ dispozici pouze vĎ angliĎ tinĎ): Indicence per 100,000

Ā½eny, 2022



VĀ k: 20+


PokrytĀ oblast: NĀrodnĀ

Reference: Ferlay J, Ervik M, Lam F, Laversanne M, Colombet M, Mery L, Piñeros M, Znaor A, Soerjomataram I, Bray F (2024).Global Cancer Observatory: Cancer Today. Lyon, France: International Agency for Research on Cancer. Available from: <https://gco.iarc.who.int/today>, accessed [16.07.24]

Definice (kĀ dispozici pouze vĀ angliĀ tinĀ): Indicence per 100,000

Rakovina ledvin

Muži, 2022




Věk k: 20+

Pokrytí oblast: Národní

Reference: Ferlay J, Ervik M, Lam F, Laversanne M, Colombet M, Mery L, Piñeros M, Znaor A, Soerjomataram I, Bray F (2024). Global Cancer Observatory: Cancer Today. Lyon, France: International Agency for Research on Cancer. Available from: <https://gco.iarc.who.int/today>, accessed [16.07.24]

Definice (k dispozici pouze v angličtině): Incidence per 100,000

Ā½eny, 2022



VĀ k: 20+


PokrytĀ oblast: NĀrodnĀ

Reference: Ferlay J, Ervik M, Lam F, Laversanne M, Colombet M, Mery L, Piñeros M, Znaor A, Soerjomataram I, Bray F (2024). Global Cancer Observatory: Cancer Today. Lyon, France: International Agency for Research on Cancer. Available from: <https://gco.iarc.who.int/today>, accessed [16.07.24]

Definice (kĀ dispozici pouze vĀ angliĀ tinĀ): Incidence per 100,000

Rakovina dĎ lohy

Ā½eny, 2022



VĀ k:

20+

Reference:


Ferlay J, Ervik M, Lam F, Laversanne M, Colombet M, Mery L, Piñeros M, Znaor A, Soerjomataram I, Bray F (2024). Global Cancer Observatory: Cancer Today. Lyon, France: International Agency for Research on Cancer. Available from: <https://gco.iarc.who.int/today>, accessed [16.07.24]

Definice
(kĀ dispozici
pouze
vĀ angliĀ
tinĀ):

Incidence per 100,000

Zvýšený krevní tlak

Dospělí, 2015




Reference:

Global Health Observatory data repository, World Health Organisation,
<http://apps.who.int/gho/data/node.main.A875?lang=en>

Definice
(k dispozici
pouze
v angličtině):

Age Standardised estimated % Raised blood pressure 2015 (SBP ≥ 140 OR DBP ≥ 90).

Muži, 2015




Reference:

Global Health Observatory data repository, World Health Organisation,
<http://apps.who.int/gho/data/node.main.A875?lang=en>

Definice (k dispozici pouze v angličtině):

Age Standardised estimated % Raised blood pressure 2015 (SBP ≥ 140 OR DBP ≥ 90).

Ďalšie, 2015



Reference:


Global Health Observatory data repository, World Health Organisation,
<http://apps.who.int/gho/data/node.main.A875?lang=en>

Definice
(ak dispozici
pouze
v angličtině):

Age Standardised estimated % Raised blood pressure 2015 (SBP $\geq$ 140 OR DBP $\geq$ 90).

Zvýšený cholesterol


Dospělí, 2008



Reference: Global Health Observatory data repository, World Health Organisation, <http://apps.who.int/gho/data/node.main.A885>

Definice
(ká dispozici
pouze
vã angličtině):
% Raised total cholesterol (≥ 5.0 mmol/L) (age-standardized estimate).


Muži, 2008



Reference: Global Health Observatory data repository, World Health Organisation, <http://apps.who.int/gho/data/node.main.A885>

Definice (k dispozici pouze v angličtině): % Raised total cholesterol (≥ 5.0 mmol/L) (age-standardized estimate).

Ā½eny, 2008




Reference: Global Health Observatory data repository, World Health Organisation, <http://apps.who.int/gho/data/node.main.A885>

Definice (kÅ disposici pouze vÅ angliÄ tinÅ): % Raised total cholesterol (≥ 5.0 mmol/L) (age-standardized estimate).

Zvýšená hladina glukózy v krvi nalačno

Muži, 2014




Reference:

Global Health Observatory data repository, World Health Organisation,
<http://apps.who.int/gho/data/node.main.A869?lang=en>

Definice
(k dispozici
pouze
v angličtině):

Age Standardised % raised fasting blood glucose (≥ 7.0 mmol/L or on medication).

Ďalšie, 2014



Reference:


Global Health Observatory data repository, World Health Organisation,
<http://apps.who.int/gho/data/node.main.A869?lang=en>

Definice
(kã dispozici
pouze
vã angliã
tinã):

Age Standardised % raised fasting blood glucose (≥ 7.0 mmol/L or on medication).

Prevalence diabetu

DospÄĚ IÄĚ, 2024




Reference:

Reproduced with kind permission International Diabetes Federation. IDF Diabetes Atlas, 11th edn. Brussels, Belgium:International Diabetes Federation, 2025. <http://www.diabetesatlas.org>

Ovarian Cancer

Ā½eny, 2022



VĀ k:

20+

Reference:


Ferlay J, Ervik M, Lam F, Laversanne M, Colombet M, Mery L, Piñeros M, Znaor A, Soerjomataram I, Bray F (2024). Global Cancer Observatory: Cancer Today. Lyon, France: International Agency for Research on Cancer. Available from: <https://gco.iarc.who.int/today>, accessed [16.07.24]

Definice
(kĀ dispozici
pouze
vĀ angličtinĀ):

Incidence per 100,000

Leukemia

Muži, 2022



Věk k:

20+

Pokrytí
oblast:

Národní

Reference:


Ferlay J, Ervik M, Lam F, Laversanne M, Colombet M, Mery L, Piñeros M, Znaor A, Soerjomataram I, Bray F (2024). Global Cancer Observatory: Cancer Today. Lyon, France: International Agency for Research on Cancer. Available from: <https://gco.iarc.who.int/today>, accessed [16.07.24]

Definice
(ká dispozici
pouze
v angličtině):

Incidence per 100,000

Pokud není uvedeno jinak, nadvěha znamená BMI mezi 25 a 29,9 kg/m², obezita znamená BMI vyšší než 30 kg/m².

Ā½eny, 2022



VĀ k: 20+

PokrytĀ oblast: NĀrodnĀ


Reference: Ferlay J, Ervik M, Lam F, Laversanne M, Colombet M, Mery L, Piñeros M, Znaor A, Soerjomataram I, Bray F (2024).Global Cancer Observatory: Cancer Today. Lyon, France: International Agency for Research on Cancer. Available from: <https://gco.iarc.who.int/today>, accessed [16.07.24]

Definice (kĀ dispozici pouze vĀ angliĀ tinĀ): Incidence per 100,000

Pokud nenĀ uvedeno jinak, nadvĀha znamenĀ BMI mezi 25Ā aĀ 29,9Ā kg/mĀ², obezita znamenĀ BMI vyĀĀĀ neĀ¼ 30Ā kg/mĀ².

Leukemia

Muži, 2022



Věk k:

20+

Pokrytí
oblast:

Národní

Reference:


Ferlay J, Ervik M, Lam F, Laversanne M, Colombet M, Mery L, Piñeros M, Znaor A, Soerjomataram I, Bray F (2024). Global Cancer Observatory: Cancer Today. Lyon, France: International Agency for Research on Cancer. Available from: <https://gco.iarc.who.int/today>, accessed [16.07.24]

Definice
(ká dispozici
pouze
v angličtině):

Incidence per 100,000

Pokud není uvedeno jinak, nadvěha znamená BMI mezi 25 a 29,9 kg/m², obezita znamená BMI vyšší než 30 kg/m².

Ā½eny, 2022



VĀ k:

20+

PokrytĀ oblast:

NĀrodnĀ

Reference:

Ferlay J, Ervik M, Lam F, Laversanne M, Colombet M, Mery L, Piñeros M, Znaor A, Soerjomataram I, Bray F (2024). Global Cancer Observatory: Cancer Today. Lyon, France: International Agency for Research on Cancer. Available from: <https://gco.iarc.who.int/today>, accessed [16.07.24]


Definice
(kĀ dispozici
pouze
vĀ angliĀ
tinĀ):

Incidence per 100,000

Pokud nenĀ uvedeno jinak, nadvĀha znamenĀ BMI mezi 25Ā aĀ 29,9Ā kg/mĀ², obezita znamenĀ BMI vyĀĀĀ neĀ¼ 30Ā kg/mĀ².

Liver and intrahepatic bile duct Cancer

Muži, 2022



Věk k:

20+

Pokrytí
oblast:

Národní


Reference:

Ferlay J, Ervik M, Lam F, Laversanne M, Colombet M, Mery L, Piñeros M, Znaor A, Soerjomataram I, Bray F (2024). Global Cancer Observatory: Cancer Today. Lyon, France: International Agency for Research on Cancer. Available from: <https://gco.iarc.who.int/today>, accessed [16.07.24]

Definice
(ká dispozici
pouze
v angličtině):

Incidence per 100,000

Ā½eny, 2022



VĀ k:

20+

PokrytĀ oblast:

NĀrodnĀ

Reference:


Ferlay J, Ervik M, Lam F, Laversanne M, Colombet M, Mery L, Piñeros M, Znaor A, Soerjomataram I, Bray F (2024). Global Cancer Observatory: Cancer Today. Lyon, France: International Agency for Research on Cancer. Available from: <https://gco.iarc.who.int/today>, accessed [16.07.24]

Definice
(kĀ dispozici
pouze
vĀ angliĀ
tinĀ):

Incidence per 100,000

Multiple Myeloma

Muži, 2022



Věk k:

20+

Pokrytí
oblast:

Národní

Reference:


Ferlay J, Ervik M, Lam F, Laversanne M, Colombet M, Mery L, Piñeros M, Znaor A, Soerjomataram I, Bray F (2024). Global Cancer Observatory: Cancer Today. Lyon, France: International Agency for Research on Cancer. Available from: <https://gco.iarc.who.int/today>, accessed [16.07.24]

Definice
(ká dispozici
pouze
v angličtině):

Indicence per 100,000

Pokud není uvedeno jinak, nadvěha znamená BMI mezi 25 a 29,9 kg/m², obezita znamená BMI vyšší než 30 kg/m².

Ā½eny, 2022



VĀ k: 20+

PokrytĀ oblast: NĀrodnĀ


Reference: Ferlay J, Ervik M, Lam F, Laversanne M, Colombet M, Mery L, Piñeros M, Znaor A, Soerjomataram I, Bray F (2024).Global Cancer Observatory: Cancer Today. Lyon, France: International Agency for Research on Cancer. Available from: <https://gco.iarc.who.int/today>, accessed [16.07.24]

Definice (kĀ dispozici pouze vĀ angliĀ tinĀ): Indicence per 100,000

Pokud nenĀ uvedeno jinak, nadvĀha znamenĀ BMI mezi 25Ā aĀ 29,9Ā kg/mĀ², obezita znamenĀ BMI vyĀĀĀ neĀ¼ 30Ā kg/mĀ².

Non Hodgkin Lymphoma

Muži, 2022



Věk:

20+

Pokrytí
oblast:

Národní


Reference:

Ferlay J, Ervik M, Lam F, Laversanne M, Colombet M, Mery L, Piñeros M, Znaor A, Soerjomataram I, Bray F (2024). Global Cancer Observatory: Cancer Today. Lyon, France: International Agency for Research on Cancer. Available from: <https://gco.iarc.who.int/today>, accessed [16.07.24]

Definice
(ká dispozici
pouze
v angličtině):

Incidence per 100,000

Pokud není uvedeno jinak, nadváha znamená BMI mezi 25 a 29,9 kg/m², obezita znamená BMI vyšší než 30 kg/m².

A¹/₂eny, 2022

VĚ k:

20+

Pokrytí
oblast:

Národní

Reference:

Ferlay J, Ervik M, Lam F, Laversanne M, Colombet M, Mery L, Piñeros M, Znaor A, Soerjomataram I, Bray F (2024). Global Cancer Observatory: Cancer Today. Lyon, France: International Agency for Research on Cancer. Available from: <https://gco.iarc.who.int/today>, accessed [16.07.24]


Definice
(k dispozici
pouze
v angličtině):

Incidence per 100,000

Pokud není uvedeno jinak, nadvěha znamená BMI mezi 25 a 29,9 kg/m², obezita znamená BMI vyšší než 30 kg/m².

Thyroid Cancer

Muži, 2022



Věk k:

20+

Pokrytí
oblast:

Národní


Reference:

Ferlay J, Ervik M, Lam F, Laversanne M, Colombet M, Mery L, Piñeros M, Znaor A, Soerjomataram I, Bray F (2024). Global Cancer Observatory: Cancer Today. Lyon, France: International Agency for Research on Cancer. Available from: <https://gco.iarc.who.int/today>, accessed [16.07.24]

Definice
(k dispozici
pouze
v angličtině):

Incidence per 100,000

Ā½eny, 2022



VĀ k:

20+

PokrytĀ oblast:

NĀrodnĀ

Reference:

Ferlay J, Ervik M, Lam F, Laversanne M, Colombet M, Mery L, Piñeros M, Znaor A, Soerjomataram I, Bray F (2024). Global Cancer Observatory: Cancer Today. Lyon, France: International Agency for Research on Cancer. Available from: <https://gco.iarc.who.int/today>, accessed [16.07.24]

Definice
(kĀ dispozici
pouze
vĀ angliĀ
tinĀ):

Incidence per 100,000